



VENDEE

Zone de Protection Spéciale (FR5212011) "Plaine Calcaire du Sud Vendée"

Suivi des rassemblements post-nuptiaux d'Œdicnème criard 2016
dans le cadre du suivi de l'impact des mesures sur la biodiversité
(fiche action 9)

Novembre
2016



vendee.lpo.fr



A.Guégnard, LPO Vendée

**ZPS "Plaine Calcaire du Sud Vendée"
(FR5212011)
Suivi des rassemblements post-nuptiaux
d'Œdicnème criard 2016 dans le cadre du suivi de
l'impact des mesures sur la biodiversité
(fiche action 9)**

Rédaction :
Aurélie GUEGNARD

**Ligue pour la Protection des Oiseaux
Vendée**

Association indépendante

Siège social : La Brétinière – 85 000 LA ROCHE SUR YON
tél. : 02 51 46 21 91 – courriel : vendee@lpo.fr ; <http://vendee.lpo.fr>

SOMMAIRE

1. Biologie.....	4
1.1 Eléments de biologie de l'espèce	4
1.2 Le rôle des rassemblements post-nuptiaux	4
2. Protocole de suivi	6
3. Résultats.....	7
3.1 Rappel des résultats de l'état initial (2010)	7
3.2 Résultats de 2016	8



INTRODUCTION

La Zone de Protection Spéciale FR 5212011, dite "Plaine Calcaire du Sud Vendée" a été désignée en 2006. Son Document d'Objectifs a été validé le 15 novembre 2011. A ce titre, des actions doivent être menées afin d'améliorer les conditions d'alimentation, de nidification et de migration des espèces de l'Annexe I de la Directive Européenne 2009/147/CE dite "Directive Oiseaux" au titre de laquelle elle a été désignée.

L'Œdicnème criard (*Burhinus oedicanus*) est une des espèces de l'Annexe I de cette directive. Il est considéré de "préoccupation mineure" au niveau national (UICN & al., 2016) et dans la liste rouge régionale (Marchadour & al., 2014). Cependant, de par les effectifs qu'elle accueille, la région a une responsabilité élevée dans la conservation de cette espèce (Marchadour & Séchet, 2008).

Cette espèce fréquente le site de la ZPS à deux périodes clé de son cycle : en période de nidification et en période migratoire dite post-nuptiale. Le présent rapport ne traitera que de cette période automnale, la reproduction ayant fait l'objet d'une autre étude.

Suite à la période de reproduction, les œdicnèmes criards, comme d'autres espèces telles que l'Outarde canepetière, ont pour habitude de se rassembler avant de migrer vers la péninsule Ibérique. On parle alors de "rassemblements post-nuptiaux".

Ces groupes sont généralement observés entre début septembre et mi-novembre, et le nombre d'oiseaux peut fortement varier au cours de la saison.

L'objectif est de recenser les rassemblements post-nuptiaux d'œdicnèmes criards dans la ZPS et d'apporter des éléments sur leur population, ainsi que sur la qualité des zones d'accueil.

Ce suivi, réalisé chaque année, a également pour objectif de mesurer l'efficacité biodiversité des mesures de gestion proposées dans le DOCOB sur la population d'œdicnèmes criards.



1. BIOLOGIE

1.1 Eléments de biologie de l'espèce

Biologie

L'Œdicnème criard est un limicole nocturne aux teintes brunes et fauves rayées de noir. Il se caractérise par une large moustache allant du bec à la nuque, une gorge et un ventre blanc, ainsi que par une large barre alaire blanche bordée de noir (Géroudet, 1982). Sa forte capacité au mimétisme est sa stratégie pour échapper aux prédateurs. Cet oiseau, originaire des steppes, affectionne les sols secs et caillouteux, avec une végétation rase et clairsemée (jachères, friches, jeunes cultures, landes, vignes, causses...). Il se reproduit aussi dans les zones de plaines présentant de larges mailles de labours et de surfaces faiblement couvertes (maïs, tournesol).

Ce migrateur est de retour dès les mois de mars/avril. Insectivore, il se nourrit de coléoptères, orthoptères (sauterelles...), ainsi que de limaces et d'escargots.

Pendant la période de reproduction, les couples se forment au sein de petites sociétés. Ils nichent dans une dépression grattée au sol, de 16 à 22 centimètres de diamètre.

La période de ponte s'étale de la mi-avril à la mi-mai et une seconde ponte peut avoir lieu en juin-juillet. Les œufs éclosent au bout de 24 à 26 jours d'incubation et les jeunes, nidifuges, quittent le nid dès le troisième jour pour suivre leurs parents. Ils sont indépendants à partir de 6 semaines (Géroudet, 1982). Dès le mois d'août et jusqu'aux mois d'octobre/novembre, les œdicnèmes se rassemblent dans les chaumes avant de migrer vers le nord de l'Afrique.




Figure 1 : Cycle de reproduction de l'Œdicnème criard (ADASEA, 2011)

1.2 Le rôle des rassemblements post-nuptiaux



Avant la migration d'automne, les œdicnèmes criards ont pour habitude de se regrouper afin de constituer des réserves énergétiques indispensables à la migration. Ainsi, des groupes de plusieurs dizaines à une centaine d'individus peuvent se former entre début septembre et mi-novembre. Ces rassemblements sont généralement localisés dans des parcelles de chaumes de maïs, de tournesol, de blé ou des jachères car ces surfaces sont dégagées et offrent une ressource alimentaire en invertébrés.

Ces rassemblements sont constitués en partie des couples nicheurs de la ZPS et des jeunes nés de ces couples mais attirent très probablement des oiseaux nichant en périphérie du périmètre voire au-delà (zones bocagères).



2. PROTOCOLE DE SUIVI

La méthode utilisée pour recenser les œdicnèmes criards en période post-nuptiale a été la même que celle utilisée lors de l'état initial du Document d'Objectifs (2010). Elle consiste à balayer aux jumelles et à la longue-vue les chaumes de céréales et maïs entre début septembre et mi-novembre. Comme pour le suivi de la reproduction, l'ensemble des chemins carrossables sont utilisés pour suivre les parcelles favorables.

Cette recherche est appliquée systématiquement dans les 3 secteurs de la ZPS dans lesquels des rassemblements étaient connus, et a été étendu aux zones potentiellement favorables.

Les dates de comptages ont été choisies pour correspondre aux dates des comptages nationaux qui ont aussi été réalisés dans les départements voisins des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime et de manière à faire un passage environ toutes les 2 à 3 semaines.

Cinq dates ont été définies :


- le 8 septembre (comptage national),
- le 20 septembre,
- le 12 octobre (comptage national),
- le 28 octobre,
- le 16 novembre.



3. RESULTATS

3.1 Rappel des résultats de l'état initial (2010)

L'état des lieux réalisé dans le cadre de l'élaboration du Document d'objectifs avait permis de localiser 3 sites principaux de rassemblement, sur les communes de Sainte-Gemme-la-Plaine, Nalliers et Auzay (ADASEA, 2011).



Carte 1 : Localisation des principaux sites de rassemblements connus dans la ZPS en 2010, avec les effectifs maximum de 2006 et 2009 (ADASEA, 2011)

Lors de l'état initial de 2010, seul trois passages avaient été effectués début septembre, mi-septembre et début octobre. Ces passages avaient permis de recenser entre 21 et 83 oiseaux au cours d'une même journée, dans l'ensemble de la ZPS, et seulement à Nalliers et Auzay. Le site de Sainte-Gemme-la-Plaine, où des rassemblements avaient été notés auparavant, n'a en effet pas été occupé en 2010 et aucun nouveau rassemblement n'a été localisé.

Tableau 1 : Nombre d'individus recensés par rassemblement en 2010

Dates/Sites	Auzay	Nalliers	Ste-Gemme-la-Plaine	Total oiseaux
04/09/2010	0	0	0	0
17/09/2010	0	21	0	21
1/10/2010	58	25	0	83

3.2 Résultats de 2016

Comme lors des recensements de 2013, 2014 et 2015, 5 passages ont été réalisés au cours de l'automne 2016, ce qui a permis de comptabiliser entre 1 et 106 individus selon les dates de passage (rappel des effectifs des années précédentes, cf.tab 2). Nous constatons cette année une diminution de l'effectif maximal d'œdicnèmes en stationnement par rapport aux 3 années précédentes.

Tableau 2 : Effectif minimum et maximum comptabilisés chaque année

Années	Nombre minimum d'individus	Nombre maximum d'individus
2013	4	162
2014	17	148
2015	6	174
2016	1	106

Le nombre d'oiseaux stationnant réellement sur ces 3 sites est probablement plus important. En effet, la localisation de certains rassemblements dans des renforcements de parcelles entre des bâtiments agricoles et des habitations peut les rendre difficilement détectables.

Cette année le rassemblement de Nalliers n'a pas été détecté. L'ensemble des secteurs favorables à l'accueil de rassemblements ont été visités sans succès autour des bourgs de Nalliers, Pouillé, Saint-Aubin-la-Plaine. Au vu des différents passages, ce groupe d'oiseaux a aussi pu s'installer en dehors du périmètre d'étude.

Par ailleurs, la modification du faciès des parcelles au gré des travaux agricoles et de la hauteur de végétation, ainsi que le micro-relief, peut être à l'origine d'une sous-estimation de l'effectif.

Le rassemblement d'Auzay s'est montré très mobile cette année et difficile à détecter. Un maximum de 14 individus a été observé. Notons que 35 individus ont été vu le 5 novembre (en dehors des dates de comptage, J.Chambrelin comm.pers.). Les nombreux travaux agricoles observés dans les parcelles habituellement utilisées peuvent expliquer la mobilité des oiseaux et la difficulté à les trouver.

Nous constatons des variations d'effectifs au fur et à mesure de la saison, comme au cours des années précédentes.

Seul le site de Saint-Gemme-la-Plaine a eu des effectifs conséquents. Le pic des effectifs a été atteint le 28 octobre (le 27 en 2015).

Comme lors des années précédentes et lors de l'état initial, très peu d'oiseaux étaient présents lors du premier passage de septembre.




Tableau 3 : Nombre d'individus recensés par rassemblement en 2016

Date	Auzay	Nalliers	Sainte-Gemme-la-Plaine	Total oiseaux
08/09/2016	-	1	-	1
20/09/2016	14	0	38	52
12/10/2016	0	0	37	37
28/10/2016	0	0	106	106
16/11/2016	0	0	4	4

Comme en 2013 et 2014, les rassemblements n'ont été contactés qu'à partir du deuxième passage (fin septembre).

Le site de rassemblement de Sainte-Gemme-la-plaine, le seul régulièrement occupé cette année, a été découvert en 2012. Situé en bordure du périmètre Natura 2000, au lieu-dit "Bienvenue", il s'est formé dès la mi-septembre. La parcelle utilisée sur ce site était en culture de maïs jusqu'à la mi-septembre.



Carte 2 : Localisation des rassemblements post-nuptiaux en 2016

La carte des rassemblements 2016 montre que les sites sont dans les mêmes secteurs que les années précédentes, à la parcelle près quand l'assolement le permet.

Globalement, au vu de leurs effectifs, les rassemblements de la ZPS captent des oiseaux de l'ensemble de la plaine du sud Vendée, bien au-delà du périmètre de la ZPS.

CONCLUSION

L'action décrite dans ce rapport a pour but de suivre les populations d'Œdicnème criard (*Burhinus oedicanus*), espèce inscrite à l'Annexe I de la Directive Européenne "Oiseaux". Cette action, décrite dans le Document d'Objectifs de la ZPS "Plaine Calcaire du Sud Vendée", a pour objectif de mesurer l'efficacité des mesures de gestion mise en place dans le cadre de l'animation du Document d'objectifs et programmes en lien (MAE, protection des nichées, maintien des chaumes...).

Les zones de rassemblements post-nuptiaux sont primordiales à la survie des oiseaux car c'est à partir de celles-ci que les oiseaux peuvent constituer les réserves énergétiques nécessaires à la migration. Ainsi, la connaissance et la localisation de ces rassemblements devraient permettre de les conserver. En effet, les données de rassemblements sont mises en relation avec la localisation des réserves de chasse *via* le partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs de Vendée. Notons que les rassemblements connus sont très proches des bourgs et qu'ils (Nalliers et Auzay) se trouvent déjà dans une réserve de chasse. L'emplacement des réserves de chasse pourra évoluer en fonction de la localisation des sites de rassemblements, afin de maintenir des zones de tranquillité pour les oiseaux.

Entre 2013, qui marque le début de ce suivi et 2015, la ZPS avait accueilli presque deux fois plus d'oiseaux en rassemblements post-nuptiaux qu'en 2010, avec un maximum de 174 oiseaux en 2015, 148 en 2014 et 162 en 2013, contre 83 en 2010. Notons cependant que ces rassemblements sont mieux suivis depuis le début de la période d'animation de la ZPS. L'augmentation des effectifs entre 2010 et 2015 est donc peut-être liée à l'augmentation de la pression d'observation.

Or l'année 2016 montre une diminution des effectifs. Les dérangements liés aux nombreux travaux (déchaume, labour, implantation d'inter-cultures), dans des zones habituellement fréquentées par les œdicnèmes criards, ont certainement eu un impact non négligeable sur les stationnements. Il est possible que les oiseaux dérangés aient formé d'autres reposoirs que nous n'avons pas repéré malgré les recherches.

Il apparaît nécessaire de continuer à suivre ces rassemblements afin de confirmer ou non cette diminution et mettre en place des actions nécessaires au maintien de ceux-ci. La réflexion sur le maintien des chaumes de céréales en hiver (basée sur le volontariat) peut y être favorable. Cependant, il faudrait pouvoir travailler avec les exploitants concernés par ces zones de rassemblements.

La poursuite du suivi des rassemblements post-nuptiaux d'œdicnèmes criards permet de contribuer à l'évaluation de l'état de conservation de la ZPS. Cependant, compte tenu des résultats du suivi de 2016, la réflexion sur le maintien des chaumes de céréales en hiver engagée en 2015 doit être parallèlement améliorée et développée dans les zones connues de rassemblement, avec les agriculteurs qui le souhaitent.



BIBLIOGRAPHIE

ADASEA, 2011. *Document d'objectifs de la Zone de Protection Spéciale - FR 5212011- Plaine Calcaire du Sud Vendée*. Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Pays de la Loire, ADASEA de la Vendée, La Roche-sur-Yon, 152 pages.

ERAUD C., 2013. *Disparition des chaumes en hiver : quel enjeu pour la conservation des populations d'oiseaux dans les agrosystèmes céréaliers*, Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage - CNERA Avifaune migratrice, Chizé, 4 pages

GEROUDET P., 1982. *Limicoles, gangas et pigeons d'Europe*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel-Paris, 235 pages.

GUEGNARD A., 2015. *ZPS plaine calcaire du sud Vendée : Suivi des rassemblements post-nuptiaux d'Oedicnème criard 2015 dans le cadre du suivi de l'impact des mesures sur la biodiversité*, DREAL Pays de la Loire, LPO Vendée, La Roche-sur-Yon, 11 pages.

GUEGNARD A., 2014. *ZPS plaine calcaire du sud Vendée : Suivi des rassemblements post-nuptiaux d'Oedicnème criard 2014 dans le cadre du suivi de l'impact des mesures sur la biodiversité*, DREAL Pays de la Loire, LPO Vendée, La Roche-sur-Yon, 11 pages.

MARCHADOUR B. BEAUDOUIN J-C., BESLOT E., BOILEAU N., MONTFORT D. RAITIERE W., TAVENON D., YESOU P., 2014. *Liste rouge des populations d'oiseaux nicheurs des Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de Loire, Bouchemaine 24 pages.

MARCHADOUR B. & SECHET E., 2008, *Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Méthodes et résultats*, Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil Régional des Pays de la Loire, Nantes, 221 pages.

UICN, FRANCE, MNHN, SEOF & ONCFS, 2016. *La liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine*, Paris, 28 pages.

